



Datos sobre VIH/SIDA en República Dominicana

- De acuerdo con el Plan Estratégico Nacional 2014-2018 las poblaciones clave y vulnerables del país son: Gays y hombres que tienen sexo con hombres, TRANS, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, migrantes haitianos, residentes de Bateyes, mujeres sin educación formal y mujeres víctimas de violencia.¹
- La prevalencia de VIH en el país es de 0.8%, sin embargo, para los hombres que tienen sexo con hombres la prevalencia es de 5%, para las trabajadoras sexuales es de 4.5% y para las mujeres sin instrucción formal es de 5.4%.²
- En 2010, la mayor parte de las nuevas infecciones ocurrieron en dos grupos: gays, trans y hombres que tuvieron sexo con hombres (33%) y en mujeres que reportaron tener relaciones sexuales de “bajo riesgo”—sólo la pareja con quien conviven-(32%).³
- Los GTH, las mujeres que tuvieron relaciones sexuales de “bajo riesgo”, los pobladores de los bateyes, la población que tuvo relaciones sexuales casuales y las trabajadoras sexuales aportan el 80% de nuevos casos de infección por VIH en República Dominicana.⁴
- La prevalencia de VIH es 54 veces mayor en las dominicanas no educadas que en las que tienen nivel de instrucción superior.⁵
- Para las jóvenes, la unión conyugal se vuelve un factor de riesgo. Las nunca casadas o unidas tienen 0% de prevalencia, las casada o unidas tienen 1%.⁶

¹ ONUSIDA (2014). Definición y dimensionamiento de poblaciones clave para el VIH y el Sida en la República Dominicana, Santo Domingo.

² INTEC (2016). Brechas de género: entre el dicho y el hecho de la autonomía de las mujeres en la República Dominicana.

³ Conavihsida (2012). Segunda Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Clave.

⁴ Conavihsida (2012). Segunda Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Clave.

⁵ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

⁶ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

- ✚ La prevalencia del VIH de una mujer de 23-24 años es 13 veces mayor a la de una de 15 a 17.⁷
- ✚ En los hombres, el aumento de la prevalencia del VIH se da en el lapso de los 24 a los 29 años, cuando pasa de 0.2% a 1.7%.⁸
- ✚ 25.8% de las adolescentes de 15-17 años de edad que reportaron tener sexo en los últimos 12 meses, lo tuvieron con hombres 10 o más años mayores.⁹
- ✚ 48% mujeres y 70% de hombres tuvieron sexo antes de los 18 años.¹⁰
- ✚ El 95% de los adolescentes y el 88% de las adolescentes no se han hecho la prueba de VIH en los últimos 12 meses.¹¹
- ✚ 50.8% de los hombres y 24.4% de las mujeres dominicanas de 15 a 49 años nunca se ha hecho la prueba de VIH/SIDA.¹²
- ✚ El 87.8% de las mujeres y 89.5% de los hombres están de acuerdo con que se les enseñe a los niños de 12 a 14 años sobre el uso del condón para la prevención del SIDA.
- ✚ En 2014, 32% de la población estudiantil recibía educación sexual.¹³
- ✚ Sólo 69% de las mujeres sin educación cree que el condón contribuye a reducir el riesgo de contraer VIH/SIDA y 11% de las mismas no justifica el uso de condón aún sepa que el esposo/compañero tiene una ITS.¹⁴
- ✚ Solo 4 de cada 10 dominicanos y 6 de cada 10 dominicanas tienen conocimiento comprensivo sobre el VIH/SIDA.¹⁵
- ✚ Casi 8 de cada 10 personas dominicanas sin educación carecen de conocimiento comprensivo sobre el VIH/SIDA.¹⁶
- ✚ 5% de las mujeres y 11% de los hombres sin educación, ni siquiera ha escuchado sobre el VIH/SIDA.¹⁷

⁷ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

⁸ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

⁹ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

¹⁰ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

¹¹ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

¹² Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

¹³ UNFPA (2015). Línea de Base de Conocimientos, Actitudes y Prácticas acerca de la Violencia Basada en Género en Estudiantes del Segundo Ciclo de Educación Primaria y en Grados de Secundaria de Escuelas Públicas y Colegios Privados en República Dominicana.

¹⁴ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

¹⁵ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

¹⁶ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

¹⁷ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

- ✚ Las jóvenes de 15-24 años¹⁸ contagiadas (0.4%) son el doble que los jóvenes (0.2%).¹⁹
- ✚ Las jóvenes dominicanas creen que la mejor forma de prevenir el contagio de VIH/SIDA es tener relaciones con una sola pareja fiel (90%), para los hombres jóvenes es el uso del condón (87%).²⁰
- ✚ El 38% de los hombres y el 33% de las mujeres de 15 a 49 años creen que el VIH/SIDA se puede transmitir por la picadura de mosquito.²¹
- ✚ Sólo 1/5 de las personas de 15 a 49 años expresa aceptación de las cuatro actitudes no discriminatorias.^{22 23}

¹⁸ De las encuestadas por ENDESA 2013

¹⁹ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

²⁰ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

²¹ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.

²² Disposición para cuidar en el hogar a familiar con SIDA, comprar vegetales frescos de un vendedor con SIDA, cree que a una maestra con SIDA que no está enferma se le debe permitir seguir enseñando, y no mantendría en secreto si un miembro de la familia tiene SIDA

²³ Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013.